



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA JILAVA
PRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE *

Șoseaua Giurgiului, nr. 279, Comuna Jilava, Județ Ilfov
Cod de înregistrare fiscal: 4420791
Telefon: +40-214 57 01 15 / Fax: +40-214 57 11 71, e-mail: primaria_jilava@yahoo.com

În atenția cetățenilor !

Având în vedere apariția unor focare de Peste Porcină Africană în județele Satu Mare, Tulcea, Constanța și Brăila, pentru prevenirea apariției și extinderii Pestei Porcine Africane în efectivele de animale de pe teritoriul județului Ilfov, în sectorul gospodăriei populației se impune respectarea următoarelor măsuri:

- Să declare și să înregistreze, în Registrul Agricol, toate animalele pe care le dețin în gospodării ; doar pentru animalele înregistrate se vor acorda despăgubiri, în cazul apariției bolii;
- Limitarea circulației suinelor (porcilor) și interdicția scoaterii din gospodării sau lăsarea liberă a acestora în localități;
- Este interzisă introducerea în gospodărie a cărnii și preparatelor din carne de porc achiziționate de la vecini, rude, târguri sau alte locuri neautorizate și controlate sanitar veterinar;
- Să ia măsuri pentru evitarea contactului suinelor (porcilor) din gospodării cu animale sălbatice care pot fi purtătoare de virus;
- În cazul în care există suspiciuni că un porc este bolnav, urgent trebuie anunțat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial și primăria, iar animalul bolnav ori cadavrul va fi izolat imediat de alte animale fără semne de boală;
- Este interzisă aruncarea ori îngroparea cadavrelor animalelor în locuri neamenajate.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA JILAVA
PRIMAR
ILIE ELEFTERIE PETRE

Cine cauzează pesta porcină africană?
Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți de toate vârstele, indiferent de gen.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?
3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.

- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24-48 de ore înaintea morții;
- vomități, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

Cum se transmite virusul?

Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:

- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
- alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.
- toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat.

În mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani. Este cel mai rezistent virus, ceea ce-l face foarte periculos.

Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire sunt singurele metode care pot ține bola departe.

